

Tabel 2. Ectoparasitica¹ voor gebruik bij katten

Werkzame stof	Diergeneesmiddel	Werkingsduur/min. behandelings-interval	Min. leeftijd, min. lichaamsgewicht	Vlo			Teek	
				Volwassen	Larve	Ei		
Avermectines								
Selamectine	Stronghold®, spot-on	Vlo: 4 w	Lft > 6 w					R/
Eprinomectine + fipronil + S-methopreen + praziquantel	Broadline®, spot-on	Vlo: 1 m, teek : 3 w	Lft > 7 w, LG> 0,6 kg					R/
Carbamaten en organofosfaten								
Propoxur	Bolfo®, spray	Herhaal na 1 - 4 w	Lft > 3 m					-
	Propoxur®, halsband	Vlo: 4 m, teek: 8 w						-
Dimpylaat	Preventef®, halsband	Vlo: 5 m						-
Chloornicotinyl neonicotinoïden								
Imidacloprid	Advantage®, spot-on	Vlo: 3 - 4 w	Lft > 8 w					
Imidacloprid + flumethrine	Seresto®, halsband	Vlo: 7-8 m, teek: 8 m	Lft > 10 w					R/
Imidacloprid + moxidectine	Advocate®, spot-on	Vlo: 4 w	Lft > 9 w, LG > 1 kg					R/
Fenylpyrazolen								
Fipronil	Effipro®, spot-on, spray Eliminall®, spray, spot-on Fiprospot®, spot-on, Fleanil®, spot-on Flevox®, spot-on Frontline®, spot-on, spray Pestigon®, spot-on	- Effipro spot on: vlo: 5 w, teek: 2 w - Effipro/Eliminall spray: vlo: 2 m, teek: 4 w - Eliminall spot-on: vlo: 4 w, teek: 4 w - Fiprospot spot-on: vlo: 4 w, teek: 1 w - Fleanil spot-on, Flevox spot-on, Frontline spot-on: vlo: 1 m, teek: 1 m - Frontline spray: vlo: 1-3 m, teek: 3-5 w - Pestigon: vlo: 5 w, teek	- Effipro/Eliminall spot-on: lft > 2 m of LG > 1 kg Effipro/Eliminall spray: lft > 2 d - Fiprospot: lft > 8 w, LG > 1 kg - Frontline spot-on: lft > 8 w, LG > 1 kg - Pestigon: lft > 8 w, LG > 1 kg					-
Fipronil + methopreen	Frontline Combo®, spot-on	Volw vlo: 4 w, immat vlo: 6 w, teek: 2 w	Lft > 8 w, LG > 1 kg					R/
	Frontline Combo Line® spot-on							-
Eprinomectine + fipronil + S-methopreen + praziquantel	Broadline®, spot-on	Vlo: 1 m, teek : 3 w	Lft > 7 w, LG > 0,6 kg					R/
Oxadiazine								
Indoxacarb	Activyl®, spot-on	Vlo: 4 w	Lft > 8 w, LG > 0,6 kg					R/
Semicarbazone								
Metaflumizon	Promeris®, spot-on	Vlo: 4-6 w	Lft > 8 w					R/
Spinosynes								
Spinosad	Comfortis®, kauwtablet	Vlo: 4 w	Lft > 14 w, LG > 1.2 kg					R/
Benzoylurea's								
Lufenuron	Program® injectie	Vlo: 6 m						R/

¹ Situatie op 6 juni 2014. De ectoparasitica die in deze tekst en tabel worden besproken zijn deze die als diergeneesmiddel in de handel toegelaten zijn. Ectoparasitica kunnen ook als biocide in de handel toegelaten zijn (zie [Lijst van toegelaten biociden](#) op de website van de FOD Volksgezondheid: www.health.belgium.be)