

Chlamydophila felis

Chlamydophila felis

- Obligaat intracellulaire Gram negatieve kiem.
- Primair doel: conjunctiva, deze kiem wordt dikwijls aangetroffen bij conjunctivitis.
- Secundair doel: respiratoire tractus.
- Voor besmetting is nauw contact tussen de katten noodzakelijk, de kiem sterft vlug af buiten de gastheer.

Vaccinatie

- In kwekerijen waar infecties met *Chlamydophila felis* endemisch zijn, wordt een voorafgaande behandeling met doxycycline gedurende 4 weken aangeraden. Wanneer de klinische tekens onder controle zijn kan de vaccinatie uitgevoerd worden.
- Dit is geen basisvaccinatie, tenzij in kattenkwekerijen of asielen waar de kiem aanwezig is.
- De primovaccinatie bestaat uit 2 injecties met een interval van 3 - 4 weken, vanaf de leeftijd van 8 tot 10 weken.
- Jaarlijkse hervaccinaties zijn aanbevolen bij katten die in een omgeving met hoog risico verblijven.
- Katten met een asymptomatische FIP- of FeLV-infectie kunnen worden gevaccineerd wanneer dit noodzakelijk zou zijn, doch enkel met geïnactiveerde vaccins.