

Felien herpesvirus en infecties van de bovenste luchtwegen - basisvaccin

Felien herpesvirus (FHV)

- Dit virus komt over de hele wereld voor en infecteert eveneens niet-gedomesticeerde katachtigen.
- Meestal menginfecties met het calicivirus en bacteriële agentia.
- FHV blijft na herstel latent aanwezig en de meeste katten blijven levenslang drager.
- Het virus kan gereactiveerd en uitgescheiden worden bij stress of bij behandeling met corticosteroiden.

Vaccinatie

- Alle gezonde dieren moeten worden gevaccineerd.
- Kittens:
 - aanbevolen schema: 2 x 1 dosis op resp. 9 en 12 weken
 - 1ste hervaccinatie: na 1 jaar
 - volgende hervaccinatie: 1 per jaar (*)
- Volwassen dieren, niet gevaccineerd of met onbekende vaccinatiestatus:
 - 2 x 1 dosis met een interval van 2 – 4 weken
 - 1ste hervaccinatie: na 1 jaar
 - volgende hervaccinatie: 1 per jaar (*)
- Na het verlopen van een hervaccinatieperiode volstaat één vaccinatie (*indicatie niet opgenomen in een SPK*). Wanneer deze periode langer is dan 3 jaar, worden 2 vaccinaties aangeraden.
- Katten die hersteld zijn van een infectie met FHV zijn meestal niet levenslang beschermd en moeten eveneens gevaccineerd worden.
- Asymptomatische katten geïnfecteerd met FIV of FeLV kunnen met succes gevaccineerd worden.
- Dieren met een stabiele chronische ziekte (zoals diabetes mellitus of hyperthyroidie) worden op eenzelfde manier gevaccineerd als gezonde katten.

(*) Voor dieren die relatief geïsoleerd van andere katten leven (binnenshuis gehouden katten) blijkt een hervaccinatie om de 3 jaar voldoende (*indicatie niet opgenomen in een SPK*).