

Feliene infectieuze peritonitis - FIP

Feliene infectieuze peritonitis - FIP

- Feliene infectieuze peritonitis wordt veroorzaakt door het felien coronavirus (FCoV).
- FCoV, een ubiquitair virus, veroorzaakt meestal een milde enteritis, maar bij 12 % van de geïnfecteerde katten kan FCoV zich ontwikkelen tot FIP.
- De aangetaste dieren zijn meestal jonger dan 1 jaar en leven in omgevingen waar veel katten samen zijn. Raskatten lijken gepredisponeerd te zijn.
- FCoV kan in een droge omgeving tot 2 maand overleven, maar wordt snel geïnactiveerd door detergentia of desinfectantia.

Vaccinatie

- Maakt geen deel uit van de basisvaccinaties.
- Er bestaat enkel een intranasaal vaccin dat beschikbaar is in België. Het gaat om een thermosensiebele mutant.
- Het vaccin werkt niet bij katten die al met FCoV besmet zijn.
- Het vaccin kan gebruikt worden bij seronegatieve kittens vooraleer ze in een endemische omgeving worden geplaatst.
- Wanneer voor vaccinatie wordt gekozen, mag de eerste dosis niet eerder dan op een leeftijd van 16 weken toegediend worden. De tweede vaccinatie wordt 3 weken later toegediend.
- Hervaccinatie: 1 jaar later en nadien 1 x per jaar.