

Felien panleucopenie - basisvaccin

Felien parvovirus

- Gevoelige dieren: alle katachtigen, de wasbeer, de nerts, de vos
- Hoge morbiditeit en mortaliteit binnen een gevoelige populatie.
- Het felien parvovirus kan meerdere maanden in de omgeving overleven en is zeer resistent voor bepaalde desinfectantia.

Vaccinatie

- Alle katten, ook binnenshuis gehouden dieren.
- Kittens:
 - aanbevolen schema: 2 x 1 dosis op 9 en op 12 weken. Een 3^{de} dosis op 16 weken is aanbevolen bij een hoge infectiedruk (asielen!) of bij kittens geboren uit moeders met een hoge As-titer ten gevolge van opeenvolgende vaccinaties zoals in kattenkwekerijen (*indicatie niet opgenomen in een SPK*).
 - Eerste hervaccinatie: na 1 jaar.
 - Volgende hervaccinatie: om de 3 jaar (of langer).
- Volwassen dieren, niet gevaccineerd of met onbekende vaccinatiestatus:
 - 1 x 1 dosis
 - Eerste hervaccinatie: na 1 jaar
 - Volgende hervaccinatie: om de 3 jaar (of langer)
- Levend verzwakte vaccins induceren een snelle bescherming, deze vaccins zijn echter niet aangewezen voor drachtige katten of bij katten jonger dan 4 weken.
- Bij uitbraak in asielen, kattenkwekerijen, enz
 - Kittens kunnen gevaccineerd worden vanaf een leeftijd van 6 weken of bij uitbraak van de ziekte vanaf 4 weken. De vaccinatie moet om de 3 à 4 weken herhaald worden tot de kittens een leeftijd hebben van 16 weken. Katten die op het moment van de vaccinatie ziek waren, moeten opnieuw gevaccineerd worden zodra ze hersteld zijn (minstens 2 weken na de vorige vaccinatie) (*indicatie niet opgenomen in een SPK*).
- Vaccinatie van katten die drager zijn van een retrovirus (deze katten dienen steeds binnenshuis gehouden te worden):
 - Dieren die drager zijn van het felien leukemievirus (FeLV) moeten gevaccineerd worden tegen FPV, bij voorkeur met geïnactiveerde vaccins. Uit voorzorg kan men het aantal vaccinaties bij deze dieren verhogen.
 - Dieren die drager zijn van het felien immunodeficiëntievirus (FIV) mogen gevaccineerd worden, met geïnactiveerde vaccins, wanneer het infectierisico groot is.
- Dieren met een stabiele chronische ziekte (zoals diabetes mellitus of hyperthyroïdie) worden op eenzelfde manier gevaccineerd als gezonde katten.