

Rabiës

Rabiësvirus

- Genus lyssavirus, zelfde genus als het Europese lyssavirus 1 en 2 bij vleermuizen (*European bat lyssavirus* - EBLV-1 en 2).
- Snelle inactivatie door de klassieke detergentia.
- Zoönose.

Vaccinatie

- Basisvaccin in endemische gebieden, in andere gebieden is vaccinatie optioneel.
- Geïnactiveerd vaccin, eventueel gecombineerd met andere geïnactiveerde of geattenuëerde valenties.
- Tijdens de primovaccinatie ontstaat na één enkele vaccinatie immunologische bescherming.
- Het immunologisch antwoord op een rabiësvaccinatie is bij katten beter dan bij honden. Meer dan 97% van de katten hebben een antistoftiter van $> 0,5$ IE/ml na een eerste vaccinatie, de titer is gecorreleerd met een goede bescherming.
- Kruisbescherming bestaat met andere lyssavirussen EBLV-1 en EBLV-2 van vleermuizen.
- Kittens:
 - Vaccinatie op 12-16 weken om interferentie met maternale antistoffen te vermijden.
Hervaccinatie: na 1 jaar.
- Sommige vaccins bieden een bescherming van 3 jaar. Nationale of regionale wetgeving kan frequentere hervaccinaties eisen.
- Katten met een asymptomatische FeLV-infectie kunnen worden gevaccineerd, maar het immunologisch antwoord is niet optimaal. Daarom worden hervaccinaties om de 6 maanden aanbevolen.
- Dieren met een stabiele chronische ziekte (zoals diabetes mellitus of hyperthyroïdie) worden op eenzelfde manier gevaccineerd als gezonde katten.